



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت درمان



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی

دبیرخانه شورای راهبردی تدوین راهنماهای بالینی

راهنمای طبابت بالینی استفاده از آنتی بیوتیک پیشگیرانه در اعمال جراحی عمومی

واحد مدیریت دانش بالینی ضایعات نخاعی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

بهمن ۱۳۹۵

مقدمه:

توسعه جوامع و گسترش نظام های سلامت، به ویژه در دو سده اخیر و نیز گسترش علوم پزشکی در جهان موجب شده است که تقریباً تمام کشورها به منظور برآورده شدن نیازهای سلامت محور خود، به تدوین راهنماهای بالینی (راهنماها، سیاست ها، استانداردها و پروتکل های بالینی) در راستای ارتقا سطح کیفی و کمی ارائه خدمت و همچنین تدوین سیاست های کلان در چارچوب استقرار پزشکی مبتنی بر شواهد گام بردارند. از سویی ضرورت تعیین حدود و ثغور اختیارات دانش آموختگان حرف مختلف پزشکی و استاندارد فضای فیزیکی و فرایندهای ارائه خدمات سبب شد تا تدوین شنا سنامه های مرتبط به منظور افزایش ایمنی، اثر بخشی و هزینه اثر بخشی در دستور کار وزارت متبوع قرار گیرد.

اندازه گیری کیفیت برای جلب اطمینان و حصول رضایت آحاد جامعه، قضاوت در زمینه عملکردها، تامین و مدیریت مصرف منابع محدود، نیازمند تدوین چنین راهنماهایی می باشد. این مهم همچنین به سیاستگذاران نیز کمک خواهد نمود تا به طور نظام مند، به توسعه و پایش خدمات اقدام نموده و از این طریق، آنان را به اهدافی که نسبت به ارائه خدمات و مراقبت های سلامت دارند، نائل نمایند تا به بهترین شکل به نیازهای مردم و جامعه پاسخ دهند. علاوه بر تدوین راهنماها، نظارت بر رعایت آنها نیز حائز اهمیت می باشد و می تواند موجب افزایش رضایتمندی بیماران و افزایش کیفیت و بهره وری نظام ارائه خدمات سلامت گردد. طراحی و تدوین راهنماهای مناسب برای خدمات سلامت، در زمره مهمترین ابعاد مدیریت نوین در بخش سلامت، به شمار می آید. اکنون در کشورمان، نیاز به وجود و استقرار راهنماهای ملی در بخش سلامت، به خوبی شناخته شده و با رویکردی نظام مند و مبتنی بر بهترین شواهد، تدوین شده است.

در پایان جا دارد تا از همکاری های بی دریغ معاون محترم درمان «جناب آقای دکتر محمد حاجی آقاجانی»، معاون محترم آموزشی «جناب آقای دکتر باقر لاریجانی» و شورای راهبردی تدوین راهنماهای بالینی در مدیریت تدوین راهنماهای طبابت بالینی، و نیز هیات های بوررد و انجمن های علمی تخصصی مربوطه، اعضاء محترم هیئت علمی مراکز مدیریت دانش بالینی و همچنین هماهنگی موثر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان های بیمه گر و سایر همکاران در معاونت های مختلف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تقدیر و تشکر نمایم.

انتظار می رود راهنماهای طبابت بالینی تدوین شده تحت نظارت فنی دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت و کمیته فنی تدوین راهنماهای بالینی، مورد عنایت تمامی نهادها و مراجع مخاطب قرار گرفته و به عنوان معیار عملکرد و محک فعالیت های آنان در نظام ارائه خدمات سلامت شناخته شود.

امید است اهداف متعالی نظام سلامت کشورمان در پرتو گام نهادن در این مسیر، به نحوی شایسته محقق گردد.

دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی

وزیر



مجری /مجریان طرح:

دکتر حسن امامی رضوی

دکتر جلال واحدیان

دکتر سیروس جعفری

دکتر حسین خلیلی

دکتر فضا الیاسی نیا

دکتر بهنام بهبودی

دکتر نوروزی

دکتر محمود پیری

تحت نظارت فنی:

گروه استاندارد سازی و تدوین راهنماهای بالینی

دفتر ارزیابی فن آوری، استاندارد سازی و تعرفه سلامت

دکتر علیرضا اولیایی منش، دکتر مجید داوری، دکتر آرمان زندی، دکتر آرمین شیروانی، مجید حسن قمی،

دکتر عطیه صباغیان پی رو، دکتر مریم خیری، دکتر بیتا لشکری، مرتضی سلمان ماهینی



فهرست :

۱. عنوان
۲. مقدمه و اپیدمیولوژی
۳. اهداف بومی سازی راهنما
۴. متدولوژی
۵. جدول انتی بیوتیک پیشگیرانه پیشنهادی در اعمال جراحی عمومی
۶. توصیه های استفاده از انتی بیوتیک پیشگیرانه پیشنهادی در اعمال جراحی عمومی
۷. همکاران پروژه
۸. منابع و مواخذ



1-1- عنوان کلی راهنما:

راهنمای بالینی تجویز انتی بیوتیک پیشگیرانه در بیماران جراحی عمومی

1-2- جمعیت هدف:

بیمارانی که تحت اعمال جراحی عمومی قرار میگیرند

1-3- کاربران هدف راهنما:

متخصصین جراحی عمومی، دستیاران جراحی عمومی، متخصصین بیهوشی، متخصصین داروسازی بالینی، مراقبین کنترل عفونت بیمارستانی

۲- مقدمه و اپیدمیولوژی

۲-۱- تعریف بیماری (کد ICD):

بر اساس تعریف مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها (CDC) عفونت مرتبط با اقدام جراحی است که در محل زخم جراحی یا در مجاورت آن در یک دوره ۳۰ روزه بعد از عمل جراحی یا ظرف مدت ۹۰ روز پس از تعبیه پروتز رخ می دهد. (ICD-10 code T81.4)

۲-۲- اپیدمیولوژی بیماری (جهانی / منطقه / کشور)

عفونت زخم جراحی شایع ترین عفونت بیمارستانی در بیماران عمل شده بوده و ۳۸٪ از کل عفونت های بیمارستانی را شامل می شود. برآوردها حاکی از آن است که عفونت زخم جراحی در یک نفر از هر ۲۴ بیماری که تحت عمل جراحی قرار گرفته، رخ دهد.

بر اساس اطلاعات NHSN میزان کلی عفونت زخم جراحی ۱,۹٪ تخمین زده میشود.

در پژوهشی که در ایران انجام شده است میزان عفونت زخم جراحی 41.2٪ کل موارد عفونتهای بیمارستانی را تشکیل میدهد.

۲-۳- اهمیت موضوع و دلایل انتخاب این بیماری جهت تدوین راهنما

ابتلا به عفونت زخم جراحی با افزایش ۶۰ درصدی خطر بستری در بخش مراقبتهای ویژه، ۶,۵ روز افزایش طول مدت بستری و افزایش حدود ۳۰۰ دلاری هزینه های بیمارستانی همراه است و نیز افزایش ۵ برابری روزهای بستری مجدد در دوره ۳۰ روزه بعد از پذیرش اولیه و هزینه بیش از ۱۰ هزار دلار را به دنبال دارد. سه چهارم مرگ و میر بیماران جراحی که دچار



عفونت زخم جراحی شده اند بعلت عفونت بیمارستانی بوده و تقریباً در تمامی موارد عفونت ارگانها و فضاهاى مختلف تحت تاثیر بوده است.

بدلايل فوق پيشگيري از عفونت زخم جراحی امرى ضرورى بوده و در كانون مراقبت هاى بهداشتى درمانى است. انتخاب صحيح عامل ضد ميكروبي مناسب بعنوان پيشگيري از عفونت بعد از عمل با در نظر گرفتن کاهش فراوانى عفونت ها , عوارض و مرگ و مير ناشى از آن و کاهش طول مدت بسترى و بازگشت سريع بيماران به زندگى و اشتغال کاهش هزينه هاى درمانى بر اهميت تدوين چنين راهنمايى تاكيد دارد.

۴-۲- اهميت و دلايل انتخاب كاربران هدف

با توجه به اينكه هدف از تجويز انتى بيوتيك پروفيلاكسى جلوگيرى از عفونت زخم جراحی در زمان انجام پروسىجر و باز شدن سد دفاعى پوستى ميباشد , جراحان عمومى و متخصصين بيهوشى به عنوان عاملين اصلى دخيل در انجام اين پروسه نقش عمده اى در چگونگى انجام اين اقدامات دارند.

۳- اهداف بومى سازى راهنما

۱-ايمنى بيشتر (Safety)

با توجه به تجويز غير ضرورى ويا روش نا صحيح و فاقد اثربخشى عوامل ضد ميكروبي , تدوين يك راهنماى مناسب و رويه اى ثابت و يكسان براى ارائه دهندگان اين خدمات در كليه سطوح به ارتقاء ايمنى بيشتر كمك خواهد نمود , چرا كه با اين تدبير از بسيارى عوارض جانبى و مشكلات سيستم بهداشتى درمانى و بيماران كاسته ميشود و از تجويز غير ضرورى دارو و يا اقدام به روش نادرست و فاقد اثربخشى جلوگيرى ميشود.

- اثربخشى بالينى بهتر (Clinical effectiveness)

پيشگيري از عفونت زخم جراحی و عوارض و مرگ و مير ناشى از آن

- مقرون به صرفه بودن هزينه ها (Cost effectiveness)

كاهش طول مدت بسترى و تحليل هزينه هاى درمانى مراقبت سلامت

- استاندارد سازى و کاهش تنوع ارايه خدمات (Standardization)

استفاده صحيح و كارآمد از انتى بيوتيك ها بر اساس اطلاعات حاصل از بهترين شواهد موجود براى پيشگيري از عفونت زخم محل عمل با در نظر گرفتن ويژگيهاى نظير كمترين اثرات سوء دارويى - كمترين هزينه و كمترين اثر بر تغيير فلور طبيعى

- افزايش رضايت مندى بيماران (Satisfaction)

با کاهش طول مدت بسترى و عوارض از عواقب فيزيولوژيكي و تبعات روحى روانى عفونت براى بيماران كاسته شده و باعث بازگشت سريعتر به محيط كار و ارتقا سطح رضايت مندى آنان ميشود.



شیوه‌های جستجو و بازیابی منابع راهنمای بالینی

جهت جمع‌آوری شواهد موجود در مورد ویژگی‌های انتی‌بیوتیک‌های مورد استفاده در پیشگیری از عفونت زخم جراحی و کاربردهای درمانی و میزان اثر بخشی آنها از گایدلاین‌های معتبر امریکا (ASHP)، استرالیا و منابع جراحی عمومی شامل شوارتز و ACS استفاده خواهد شد.

کلمات کلیدی برای جستجو شامل عفونت زخم جراحی، انتی‌بیوتیک پروفیلاکتیک و گایدلاین‌های مرتبط می‌باشد. معیارهای انتخاب خطوط راهنما شامل در دسترس بودن و کاربردی بودن و مطابقت با منابع و امکانات کشورمان می‌باشد.

جستجوی راهنما	
منبع راهنما	نشانی اینترنتی
American Society of Health-System Pharmacists	http://www.ashp.org
South Australian expert Advisory Group on Antibiotic Resistance (SAAGAR))	http://www.sahealth.sa.gov.au/
American College of Surgeons (ACS) Surgery	http://www.acssurgery.com .
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)	http://www.sign.ac.uk/guidelines/index.html
Schwartz's Principles of Surgery, Tenth edition	



جدول شماره ۴-۱: تحلیل توصیه های بالینی راهنماهای مورد مطالعه

سوال بالینی	P	I	C	نوع سوال		Phrase of Recommendation	کد شواهد پشتیبان
متن پرسش (یا شماره)						R1:choice R2:in β -Lactam Allergy	
انتی بیوتیک پرو فیلاکتیک در اعمال جراحی گاستروئودنال با باز شدن لومن و در موارد عدم باز شدن لومن و مری شماره ۱				ایا سفازولین در پیشگیری از عفونت زخم جراحی در اعمال جراحی معده و دئودنوم موثر است؟	G1 ASHP2013	R1: cefazolin R2: Clindamycin or vancomycin + aminoglycoside or fluoroquinolone	495848
					G2 AUS2013	R1 Cefazolin	
					G3 ACS2014	R1 Cefazolin	
					G4 Schwartzs 2015	R1 Cefazolin	
انتی بیوتیک پرو فیلاکتیک در اعمال جراحی کیسه صفرا و مجاری صفراوی در افراد پرخطر و غیرالکتیو شماره ۲				ایا سفازولین در پیشگیری از عفونت زخم جراحی در اعمال جراحی هپاتوبیلیاری موثر است؟	G1 ASHP2013	R1: cefazolin R2: Metronidazole + aminoglycoside or fluoroquinolone	9261583
					G2 AUS2013	R1: cefazolin	
					G3 ACS2014	R1: cefazolin	
					G4 Schwartzs 2015	R1: cefazolin	

۷۰۰۰۰۶۳	R1: cefazolin+ metronidazole	G1 ASHP201 3					
	R1: metronidazole plus either Cefazole or gentamicin R2: Metronidazole + aminoglycosideg or fluoroquinolone	G2 AUS2013	ایاسفازولین و مترونیدازول در پیشگیری از عفونت زخم جراحی در اعمال جراحی اپاندکتومی بدون عارضه موثر است؟				انتی بیوتیک پرو فیلاکتیک در اپاندیسیت های بدون عارضه شماره ۳
	R1: Single dose cefoxitin 2gr	G۳ ACS2014					
	R1: cefazolin+ metronidazole	G۴ Schwartzs 2015					
۷۹۳۰۵۴۲	R1: ampicillin-sulbactam	G1 ASHP201 3	ایامپی سولباکتام در پیشگیری از عفونت زخم جراحی در اعمال جراحی اپاندکتومی بدون عارضه موثر است؟				انتی بیوتیک پرو فیلاکتیک در اپاندیسیت های بدون عارضه شماره ۴
495848	R1: Cefazolin R2: Clindamycin + aminoglycosideg or or fluoroquinolone	G1 ASHP201 3					
		G2 AUS2013	ایا سفازولین در پیشگیری از عفونت زخم جراحی در اعمال جراحی روده باریک غیر انسدادی موثر است؟				انتی بیوتیک پرو فیلاکتیک در اعمال جراحی روده باریک غیر انسدادی شماره ۵
	Cefazolin	G۴ Schwartzs 2015					
۱۹۴۶۱۵۵۸	R1: Cefazolin + metronidazole	G1 ASHP201 3	ایاسفازولین و مترونیدازول در				انتی بیوتیک پرو فیلاکتیک در

15227616	R2: Metronidazole + aminoglycoside or fluoroquinolone		پیشگیری از عفونت زخم جراحی در اعمال جراحی روده باریک انسدادی شماره ۶			
		G2 AUS2013	انسدادی موثر است؟			
		G۳ ACS2014				
	Cefazolin or ceftriaxone + metronidazole	G۴ Schwartzs 2015				
۷۹۳۰۵۴۲	R1: ampicillin-sulbactam	G1 ASHP2013	ایامپی سولباکتام در پیشگیری از عفونت زخم جراحی در اعمال جراحی روده باریک انسدادی موثر است؟			انتی بیوتیک پرو فیلاکتیک در اعمال جراحی روده باریک انسدادی شماره ۷
۱۹۴۶۱۵۵۸	R1: Cefazolin + metronidazole	G1 ASHP2013				
15227616	R2: metronidazole + aminoglycoside or fluoroquinolone		ایاسفازولین و مترونیدازول در پیشگیری از عفونت زخم جراحی در اعمال جراحی کولورکتال موثر است؟			انتی بیوتیک پرو فیلاکتیک در اعمال جراحی کولورکتال شماره ۸
	metronidazole plus either Cefazolin or gentamicin	G2 AUS2013				
		G۳ ACS2014				
	Cefazolin + metronidazole	G۴ Schwartzs 2015				
۷۹۳۰۵۴۲	R1: ampicillin-sulbactam	G1 ASHP2013	ایامپی سولباکتام در پیشگیری از عفونت زخم جراحی در اعمال			انتی بیوتیک پرو فیلاکتیک در

			جراحی کولورکتال موثر است؟			اعمال جراحی کولورکتال شماره ۹
19591158 ۱۸۶۱۴۱۴۴	R1: Cefazolin R2: Clindamycin, vancomycin	G1 ASHP201 3	ایا سفازولین در			انتی بیوتیک پرو فیلا کتیک در اعمال جراحی ترمیم هرنی شماره ۱۰
	Cefazolin	G2 AUS2013	پیشگیری از عفونت زخم جراحی در اعمال			
	Cefazolin	G۳ ACS2014	جراحی ترمیم هرنی به روش باز با تعبیه			
	Cefazolin	G۴ Schwartzs 2015	مش موثر است؟			
			ایا سفازولین در			انتی بیوتیک پرو فیلا کتیک در اعمال جراحی ترمیم هرنی شماره ۱۱
19591158 ۱۸۶۱۴۱۴۴	Cefazolin	G2 AUS2013	پیشگیری از عفونت زخم جراحی در اعمال			
			جراحی ترمیم هرنی به روش			
			لاپارا سکوپیک با تعبیه مش موثر است			
2011- 10137 SAAGAR	NOT RECOMMENDE D	G2 AUS2013	ایا عدم تجویز انتی بیوتیک پیشگیرانه در اعمال جراحی تیروئید و پاراتیروئید ایمن میشود؟			انتی بیوتیک پرو فیلا کتیک در اعمال جراحی تیروئید شماره 12



24249389 ۲۲۸۴۶۹۵۵	Cefazolin + metronidazole	G2 AUS2013	ایاسفازولین و مترونیدازول در پیشگیری از عفونت زخم جراحی در اعمال جراحی لاپاراتومی تجسسی و ازاد سازی چسبندگیها موثر است؟			انتی بیوتیک پرو فیلاکتیک در لاپاراتومی تجسسی و ازاد سازی چسبندگی ها شماره ۱۳
	R1: Cefazolin R2: Clindamycin, vancomycin	G2 AUS2013	ایا سفازولین در پیشگیری از عفونت زخم جراحی در اعمال جراحی پستان شامل ماستکتومی , بازسازی			انتی بیوتیک پرو فیلاکتیک در اعمال جراحی پستان
	cefazolin	G۴ Schwartzs 2015	و بیوپسی از لنف نود نکهبان و اعمال جراحی مجدد طی ۶ هفته از جراحی اول موثر است ؟			شماره ۱۴



۵- جدول آنتی بیوتیک های پیشگیرانه پیشنهادی در اعمال جراحی عمومی

نوع و محل جراحی	آنتی بیوتیک پیشگیرانه پیشنهادی	آنتی بیوتیک پیشگیرانه پیشنهادی در موارد حساسیت به سفالوسپورین ها
اعمال جراحی گاستروئودنال با باز شدن لومن	cefazolin	Clindamycin or vancomycin + Aminoglycoside or fluoroquinolone
اعمال جراحی الکتیو کیسه صفرا و مجاری صفراوی در افراد پرخطر و غیر الکتیو	cefazolin	Metronidazole + aminoglycosideg or fluoroquinolone
آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک در اپاندیسیت های بدون عارضه*	cefazolin+metronidazole or ampicillin-sulbactam	Metronidazole + aminoglycosideg or fluoroquinolone
اعمال جراحی روده باریک غیر انسدادی	cefazolin	Clindamycin + aminoglycosideg or or fluoroquinolone
اعمال جراحی روده باریک انسدادی	Cefazolin + metronidazole Or ampicillin-sulbactam	Metronidazole + aminoglycosideg or fluoroquinolone
اعمال جراحی کولورکتال	Cefazolin + metronidazole Or ampicillin-sulbactam	Metronidazole + aminoglycosideg or fluoroquinolone
اعمال جراحی ترمیم هرنی به روش باز یا لاپاراسکوپی با تعیبه مش	Cefazolin	Clindamycin or vancomycin
اعمال جراحی تیروئید و پاراتیروئید	NOT RECOMMENDED	NOT RECOMMENDED
اعمال جراحی آزاد سازی چسبندگی ها بدون انسداد	Cefazolin + metronidazole	metronidazole + aminoglycosideg or fluoroquinolone
اعمال جراحی پستان شامل ماستکتومی همراه دیسکسیون لنفاوی زیر بغلی , بازسازی و اعمال جراحی مجدد طی ۶ هفته از جراحی ابتدایی	Cefazolin	Clindamycin or vancomycin
اعمال جراحی تمیز غیر عارضه دار پستان شامل لامپکتومی و اکسیزیون بافت اسکار و اکسیزیون لوکال	NOT RECOMMENDED	NOT RECOMMENDED



توضیحات جدول

* عامل ضد میکروبی باید ظرف مدت ۶۰ دقیقه قبل از انسیزیون تزریق شود. (این مدت جهت سیپروفوکساسین و وانکومايسين ۱۲۰ دقیقه میباشد)

* درحالی که تک دوز انتی بیوتیک با هدف پیشگیری در تمام اعمال جراحی کفایت میکند، مدت زمان تجویز عامل میکروبیال در تمام اعمال جراحی باید کمتر از ۲۴ ساعت باشد.

* در بیماران شناخته شده کولونیزه با استاف اورئوس مقاوم به متی سیلین تک دوز وانکومايسين به عوامل پیشنهاد شده اضافه شود

* در بیماران با خطر بالای عفونت پس از جراحی دستگاه گوارش فوقانی استفاده از انتی بیوتیک پیشگیرانه باید مدنظر قرار گیرد شامل: PH معده افزایش یافته شامل دریافت کنندگان عوامل ضد ترشح اسید، پرفوراسیون گاستروئوئونال، کاهش مویتیلیتی معده، انسداد خروجی معده، خونریزی معده، چاقی مرضی و بدخیمی میباشد.

* در موارد اعمال جراحی دستگاه گوارش فوقانی بدون باز شدن لومن و آلودگی با محتویات دستگاه گوارش استفاده از انتی بیوتیک پیشگیرانه الزامی نمیشود. در موارد ریسک عفونت بالاتر از ۱۵٪ تجویز انتی بیوتیک پیشگیرانه منطقی میباشد.

* عوامل نشان دهنده خطر بالای عوارض عفونی در موارد کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک شامل: موارد اورژانس، دیابت، مدت زمان جراحی طولانی، پارگی حین جراحی کیسه صفرا، سن بالای ۷۰ سال، تبدیل عمل جراحی لاپاراسکوپیک به باز، ASA class ۳ و یا بالاتر از ۳، سابقه کولیک صفراوی ظرف مدت ۳۰ روز قبل از پروسیجر، مداخله مجدد طی مدت زمان کمتر از یک برای عارضه غیر عفونی، کله سیستیت حاد، الودگی با صفرا، زردی، بارداری، کیسه صفراوی غیرکارکردی، سرکوب ایمنی، تعبیه پروتز.

با توجه به اینکه بسیاری از موارد فوق پس از انجام پروسیجر مشخص میشود، تجویز تک دوز عامل ضد میکروبی پیشگیرانه در تمام اعمال جراحی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک منطقی میباشد.

۶- توصیه های استفاده از انتی بیوتیک های پیشگیرانه پیشنهادی در اعمال جراحی عمومی

بر اساس نتایج حاصل از جمع بندی نمرات داده شده به هر پرسش (قابلیت بومی سازی و مزیت بالینی) توسط اعضای پانل تخصصی پیشنهادات زیر استخراج گردید:

۱. استفاده از سفازولین به عنوان عامل ضد میکروبی در اعمال جراحی گاسترودونال (high agreement) و در موارد حساسیت به سفالو سپورینها استفاده از کلیندامایسین یا وانکومايسين به همراه فلوروکینولون یا امینوگلیکوزیدها (equivocal agreement) عنوان عامل ضد میکروبی میباشد.
۲. استفاده از سفازولین به عنوان عامل ضد میکروبی در اعمال جراحی الکتیو کیسه صفرا و مجاری صفراوی در افراد پرخطر و غیر الکتیو (high agreement) و در موارد حساسیت به سفالو سپورینها استفاده از مترونیدازول به همراه فلوروکینولون یا امینوگلیکوزیدها (equivocal agreement) عنوان عامل ضد میکروبی میباشد.



۳. استفاده از سفازولین + مترونیدازول به عنوان عامل ضد میکروبی در اعمال جراحی اپاندیسیت های بدون عارضه (high agreement) و در موارد حساسیت به سفالوسپورین ها استفاده از مترونیدازول به همراه فلوروکینولون یا امینوگلیکوزیدها (equivocal agreement) عنوان عامل ضد میکروبی میباشد.
۴. استفاده از امپی سولباکتام به عنوان عامل ضد میکروبی در اعمال جراحی اپاندیسیت های بدون عارضه (high agreement) میباشد.
۵. استفاده از سفازولین به عنوان عامل ضد میکروبی در اعمال جراحی روده باریک غیر انسدادی (high agreement) و در موارد حساسیت به سفالوسپورینها استفاده از مترونیدازول به همراه فلوروکینولون یا امینوگلیکوزید ها (equivocal agreement) عنوان عامل ضد میکروبی میباشد.
۶. استفاده از سفازولین + مترونیدازول به عنوان عامل ضد میکروبی در اعمال جراحی روده باریک انسدادی (high agreement) و در موارد حساسیت به سفالوسپورینها استفاده از مترونیدازول به همراه فلوروکینولون یا امینوگلیکوزید ها (equivocal agreement) عنوان عامل ضد میکروبی میباشد.
۷. استفاده از امپی سولباکتام به عنوان عامل ضد میکروبی در اعمال جراحی روده باریک انسدادی (high agreement) میباشد.
۸. استفاده از سفازولین + مترونیدازول به عنوان عامل ضد میکروبی در اعمال جراحی کولورکتال (high agreement) و در موارد حساسیت به سفالوسپورینها استفاده از مترونیدازول به همراه فلوروکینولون یا امینوگلیکوزید ها (high agreement) عنوان عامل ضد میکروبی میباشد.
۹. استفاده از امپی سولباکتام به عنوان عامل ضد میکروبی در اعمال جراحی کولورکتال (high agreement) میباشد.
۱۰. استفاده از سفازولین به عنوان عامل ضد میکروبی در اعمال جراحی ترمیم هرنی به روش باز با تعبیه مش و ترمیم هرنی به روش لاپاراسکوپی با تعبیه مش (high agreement) و در موارد حساسیت به سفالوسپورینها استفاده از کلیندامایسین یا وانکومایسین (high agreement) عنوان عامل ضد میکروبی میباشد.
۱۱. عدم استفاده از انتی بیوتیک پیشگیرانه در اعمال جراحی تیروئید و پاراتیروئید (high agreement)
۱۲. استفاده از سفازولین + مترونیدازول به عنوان عامل ضد میکروبی در اعمال جراحی ازاد سازی چسبندگی ها بدون انسداد (equivocal agreement) و در موارد حساسیت به سفالوسپورینها استفاده از مترونیدازول به همراه فلوروکینولون یا امینوگلیکوزیدها (equivocal agreement) عنوان عامل ضد میکروبی میباشد.
۱۳. استفاده از سفازولین به عنوان عامل ضد میکروبی در اعمال جراحی پستان شامل ماستکتومی به همراه دیسکسیون غدد لنفاوی زیر بغلی , بازسازی و اعمال جراحی مجدد ظرف ۶ هفته از عمل جراحی قبلی (high agreement) و در موارد حساسیت به سفالوسپورینها استفاده از کلیندامایسین یا وانکومایسین (equivocal agreement) عنوان عامل ضد میکروبی میباشد.
۱۴. عدم استفاده از انتی بیوتیک پیشگیرانه در اعمال جراحی تمیز غیر عارضه دار پستان شامل لامپکتومی و اکسیزیون بافت اسکار و اکسیزیون لوکال (high agreement)



۷- همکاران پروژه

۷-۱ اعضای هسته مرکزی

اقای دکتر حسن امامی رضوی - آقای دکتر جلال واحدیان - آقای دکتر سیروس جعفری - آقای دکتر حسین خلیلی - خانم دکتر فضا الیاسی نیا - آقای دکتر بهنام بهبودی - آقای دکتر نوروزی - آقای دکتر محمود پیری

۷-۲ اعضای پانل تخصصی بررسی قابلیت بومی سازی و مزیت بالینی استفاده از انتی بیوتیک پیشگیرانه در اعمال جراحی عمومی:

اقای دکتر ابوالفضل افشارفرد - آقای دکتر محمدرضا کلانتر معتمدی - آقای دکتر ابولقاسم اباسهل - آقای دکتر سیاوش صحت - آقای دکتر محمدعلی محقق - آقای دکتر فرامرز کریمیان - آقای دکتر فیروز بهبودی - آقای دکتر حبیب اله دشتی - آقای دکتر امیرپاشا ابراهیمی

۸- منابع و مواخذ

<i>American Society of Health-System Pharmacists</i>
<i>South Australian expert Advisory Group on Antibiotic Resistance (SAAGAR))</i>
<i>American College of Surgeons (ACS) Surgery</i>
<i>Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)</i>
<i>Schwartz's Principles of Surgery, Tenth edition</i>



۷- جدول زمان بندی مراحل اجرای طرح

ردیف	فعالیت	مسئول	هفته											
			۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
۱	معرفی طرح و چگونگی انجام آن	اقای دکتر امامی رضوی *												
۲	بررسی گاید لاین های موجود و مطرح شده توسط اعضا و انتخاب منابع	تمامی اعضا *												
۳	تکمیل و انجام جداول براساس منابع تعیین شده	اقای دکتر بهبودی *												
۴	انتخاب نوع انتی بیوتیک در مورد سوالات بالینی ۱-۵	تمامی اعضا *												
۵	انتخاب نوع انتی بیوتیک در مورد سوالات بالینی ۶-۱۴ همچنین بررسی شواهد موارد مورد اختلاف سوالات ۱-۵	تمامی اعضا اقای دکتر بهبودی *												
۶	جمع بندی کلی و بررسی شواهد موارد مورد اختلاف سوالات ۶-۱۴	تمامی اعضا اقای دکتر بهبودی *												
۷	تدوین راهنمای بالینی تجویز انتی بیوتیک پیشگیرانه در بیماران جراحی عمومی		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

