

چکیده:

مقدمه: پذیرش های مجدد بیمارستانی به علت تأثیر بر روی هزینه ها و کیفیت مراقبت های بیمارستانی و تحمیل بار اضافی برای بیماران و خانواده هایشان، یکی از موارد نگران کننده برای بیماران، فراهم کنندگان مراقبت و بیمارستان ها به حساب می آیند. در تمام دنیا مراجعات سالمندان به اورژانس علل مختلف و شیوع بالایی دارد. هدف این مطالعه بررسی شیوع مراجعه مجدد به اورژانس و تعیین شایع ترین علل مراجعه مجدد سالمندان به اورژانس می باشد.

مواد و روش کار: در بازه ی زمانی 95/1/1 الی 95/12/29 بطور تصادفی ماهانه 2 روز و در کل 12 ماه 24 روز با روش اعداد تصادفی انتخاب شدند و در طی این 24 روز از تمامی بیماران مراجعه کننده به اورژانس در طی 24 ساعت، که بالای 60 سال دارند از طریق پرونده های الکترونیکی ثبت شده شناسایی شده و مورد بررسی قرار گرفتند و در آن 135 که بیمار طی 72 ساعت پس از پذیرش اولیه مراجعه ی مجدد به اورژانس داشته اند انتخاب و در مطالعه شرکت داده شدند.

یافته ها: میانگین سنی مردان به شکل معنی داری بیشتر از میانگین سنی زنان بود. ($p=0.013$). نحوه ی زندگی شخصی در بین مراجعات مجدد سالمندان به شکل معنی داری بیشتر از گروه های دیگر می باشد ($P=0.00$). بیشترین زمان مراجعه ی بیماران در شیفت شب بود. نحوه ی مراجعه ی بیماران نشان داد میزان مراجعه توسط EMS در مراجعات ثانویه کاهش یافته است. شایع ترین بیماری در بین تشخیص های اولیه مربوط به بیماری قلبی-عروقی بود و ترکیب جنسیتی تنها در بیماری دیابت به شکل معنی داری در زنان بیش از مردان بود ($p=0.02$). 68٪ از بیماران مراجعه کننده ی مجدد به اورژانس به همان دلیل تشخیص اولیه پذیرش شده بودند و بیشترین تطابق تشخیص ها در دو زمان در بین بیماری ها مربوط به بیماری قلبی با (78٪) درصد و کمترین مربوط به تروما با (0٪) بود.

نتیجه گیری: بیشترین علت مراجعه ی سالمندان در طی 72 ساعت پس از پذیرش اولیه در اورژانس مربوط به بیماری های قلبی و پس از آن دیابت و کمترین علت مراجعه مجدد مربوط به عوامل ترومایی بود. همچنین 67 درصد از مراجعات مجدد به همان علت تشخیص اولیه صورت گرفته بود در حالی که 26 درصد از مراجعت های مجدد منجر به بستری و نیازمند مراقبت های بیشتر بودند.

واژگان کلیدی :

اورژانس , شیوع , سالمند.