

عنوان: مقایسه عوامل خطر بیماریهای ایسکمیک قلبی در بیماران با و بدون اختلالات جنسی ایجاد شده

بعد از جراحی رادیکال پروستاتکتومی با حفظ عصب به دلیل سرطان لوکالیزه پروستات

کمال الدین حسن زاده نوکاشتی^۱، فریبرز اکبرزاده^۲، مرتضی قوجزاده^۳، یداله احمدی عصر بدر^۱، عمادالدین رضایی تالارپشتی^{۴*}

۱. دانشیار ارولوژی، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران
۲. استاد بیماری های قلب و عروق، مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران
۳. دانشیار، مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد ایران، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
۴. * دستیار تخصصی ارولوژی، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده:

مقدمه:

جراحی رادیکال پروستاتکتومی درمان انتخابی سرطان پروستات بوده بطوریکه اختلال نعوظ یکی از عوارض آن می باشد. بیماری کرونری نیز می تواند باعث اختلالات جنسی شود. هدف این مطالعه مقایسه عوامل خطر بیماریهای ایسکمیک قلبی در بیماران با و بدون اختلالات جنسی ایجاد شده بعد از جراحی رادیکال پروستاتکتومی با حفظ عصب به دلیل سرطان لوکالیزه پروستات بود.

مواد و روش ها:

وجود عوامل خطر بیماری قلبی-عروقی، بیماریهای ایسکمیک قلبی، یافته های اکوکاردیوگرافی توسط متخصص قلب مورد بررسی قرار گرفت. وضعیت عملکرد جنسی بیماران قبل از جراحی و ۶ ماه پس از جراحی با پرسشنامه فارسی IIEF مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس تمام داده ها با spss نسخه ۱۹ آنالیز می شود.

نتایج:

در این مطالعه از ۱۰۳ بیمار ۹۶ بیمار تحت رادیکال پروستاتکتومی قرار گرفتند. بیماران با و بدون اختلال جنسی به ترتیب ۲۲ نفر (۲۲/۹٪) و ۷۴ نفر (۷۷٪) بودند. تعداد عوامل خطر قلبی عروقی بین دو گروه با و بدون اختلال جنسی از نظر آماری معنی دار شد ($P < 0.001$).

نتیجه گیری:

عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی و وضعیت بد قلبی عروقی بیمارانی که کاندید جراحی رادیکال پروستاتکتومی، بر میزان توانایی جنسی بیماران پس از جراحی اثر سوء می گذارند.

کلید واژه ها:

رادیکال پروستاتکتومی، نعوظ، عوامل خطر، قلبی-عروقی، اختلالات جنسی