

چکیده

زمینه و هدف: خودکشی از مهمترین اورژانس های روانپزشکی محسوب می گردد و اهمیت آن روز به روز بیشتر می گردد. از عوامل بسیار مهم خودکشی الکلیسم، سوء مصرف دارو، افسردگی، اسکیزوفرنی و سایر بیماری های روانی و اختلالات شخصیتی است. در مورد خصوصیات شخصیتی زنان اقدام کننده به خودکشی مطالعات کافی در ایران صورت نگرفته است. لذا هدف این مطالعه بررسی خصوصیات شخصیتی زنان با اقدام به خودکشی با دو روش خودسوزی و مسمومیت می باشد.

روش کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، ۹۰ بیمار مونث اقدام کننده به خودکشی (۶۲ بیمار به روش مسمومیت و ۲۸ بیمار به روش خودسوزی) وارد مطالعه شدند. پس از تکمیل رضایتنامه آگاهانه، پرسشنامه MMPI در اختیار داوطلبین قرار گرفته و تکمیل گردید. تحلیل پرسشنامه MMPI تکمیل شده توسط بیماران، با استفاده از نرم افزار MMPI-۱ نسخه ۴,۱ تولید شده توسط موسسه تحقیقات علم رفتاری، شناختی سینا و تحلیل داده های آماری ثبت شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS™ ۱۷ انجام پذیرفت.

نتایج: میانگین سنی کل بیماران در مطالعه حاضر برابر $26,29 \pm 0,61$ سال و به تفکیک در گروه مسمومیت برابر $24,55 \pm 0,65$ سال و خودسوزی برابر $30,14 \pm 1,02$ سال بود ($P < 0,0001$). از ۹۰ بیمار مورد بررسی، ۴۷ بیمار (۵۲,۲٪) مجرد و ۴۳ بیمار (۴۷,۸٪) متاهل بودند. به تفکیک نوع روش اقدام به خودکشی، از ۶۲ بیمار در گروه مسمومیت، ۳۶ بیمار

(۵۸,۱٪) مجرد و ۲۶ بیمار (۴۱,۹٪) متاهل بودند، همچنین از ۲۸ بیمار در گروه خودسوزی، ۱۱ بیمار (۳۹,۳٪) مجرد و ۱۷ بیمار (۶۰,۷٪) متاهل بودند ($P = ۰,۰۷$). در مجموع ۲۹ بیمار از ۹۰ بیمار مورد بررسی (۳۲,۲٪) به درجاتی از افسردگی دچار بودند. به گونه ای دیگر ۲۰ بیمار از ۶۲ بیمار (۳۲,۳٪) و در گروه خودسوزی ۹ بیمار از ۲۸ بیمار (۳۲,۱٪) دارای درجاتی از افسردگی بودند ($P = ۰,۵۹$). در مجموع ۳۵ بیمار از ۹۰ بیمار (۳۸,۸٪) دارای معیارهای مثبت برای اسکیزوفرنی بودند. از ۳۵ بیمار ذکر شده، ۱۹ بیمار در گروه مسمومیت و ۱۶ بیمار در گروه خودسوزی قرار داشتند ($P = ۰,۰۱$). بیماری روانی نوروتیک که شامل هیستری همراه با افسردگی و خود بیمار انگاری می باشد، در ۱ بیمار (۱,۶٪) در گروه مسمومیت و ۱ بیمار (۳,۶٪) در گروه خودسوزی مشاهده گردید ($P = ۰,۵۲$).

نتیجه گیری: خصوصیات دموگرافیک (سن، وضعیت تاهل) در خانم های اقدام کننده به خودسوزی و مسمومیت تفاوت معنی داری نسبت به هم داشته و ارتباط معنی داری بین آن ها با روش اقدام به خودکشی مشاهده گردید. سابقه بیماری روانی به خصوص اسکیزوفرنی و پارانویا می تواند عامل مساعد کننده مهمی در بروز خودکشی به خصوص به روش خودسوزی باشد. لذا با توجه به ارتباط صفات شخصیتی با روش های مختلف اقدام به خودکشی در خانم ها توجه بیشتر به خصوصیات شخصیتی، روانپزشکی و درمان اختصاصی اختلالات شخصیتی آن ها می تواند میزان خطر خودکشی، به طور خاص به روش خودسوزی را کاهش دهد.

کلمات کلیدی: صفات شخصیتی، زن، اقدام به خودکشی، مسمومیت، خود سوزی