

خلاصه فارسی

مقدمه: مرگ و میر بیمارستانی امروز قسمت بزرگی از مرگ های جامعه را به خود اختصاص می دهد. اورژانس بیمارستان به عنوان خط اول برخورد با بیماران دارای اهمیت ویژه ای است. کهنشاندهند هاولینخطاز مراقبتونقطههورودبهرترینامکاناتمراقبتهایبهداشتیدرسراسرجهان است. مرگومیربیماراندربخشاورژانسمشکلیاستکههدرسالهاییاخیرتشدیدیافتهاست. با توجه به اهمیت موضوع مطالعات بیشتری جهت قضاوت درست در مورد علل مرگ و میر در اورژانس مورد نیاز است که مطالعه حاضر در جهت شناخت بهتر علل مرگ و میر در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام رضا تبریز در سال ۱۳۹۳ انجام شده است.

هدف: میزان شیوع و دموگرافیک مرگ و میر در مراجعین اورژانس بیمارستان امام رضا تبریز در سال ۱۳۹۳

روش کار و مواد: تمامی افراد مراجعه کننده به اورژانس امام رضا شهر تبریز در طول سال ۱۳۹۳ که به هر علت دچار مرگ در بیمارستان شده بودند به صورت سرشماری یواردمطالعهدشدند. آمار توصیفی با تست های فراوانی، درصد فراوانی محاسبه گردید.

یافته ها: از میان ۶۰۴ نفر از افراد فوت شده در اورژانس بیمارستان امام رضا شهر تبریز به ترتیب ۳۷۲ نفر با فراوانی درصدی ۶۱/۶٪ مرد و ۲۳۲ نفر با فراوانی درصدی ۳۸/۴٪ زن بودند.

۱۲ نفر با فراوانی درصدی ۲٪ زیر ۱۵ سال، ۵۲ نفر با فراوانی درصدی ۸/۶٪ بین ۱۵ تا ۲۹ سال، ۵۶ نفر با فراوانی درصدی ۹/۳٪ بین ۳۰ تا ۴۴ سال، ۱۲۶ نفر با فراوانی درصدی ۲۰/۹٪ بین ۴۵ تا ۵۹ سال، ۱۶۸ نفر با فراوانی درصدی ۲۷/۸٪ بین ۶۰ تا ۷۴ سال و ۱۹۰ نفر با فراوانی درصدی ۳۱/۵٪ بیش از ۷۵ سال داشتند.

۴۴۲ نفر با فراوانی درصدی ۷۳/۲٪ سابقه ی قبلی بیماری های مزمن قبلی را داشتند.

۱۱۴ نفر با فراوانی درصدی ۱۸/۹٪ بر اثر تروما و ۴۹۰ نفر با فراوانی درصدی ۸۱/۱٪ بر اثر سایر بیماری ها فوت شدند

۱۹۴ نفر با فراوانی درصدی ۳۲/۱٪ اعزامی و ۳۶۲ نفر با فراوانی درصدی ۵۹/۹٪ غیر اعزامی بودند. مدت اقامت در اورژانس به ترتیب ۴۳۸ نفر با فراوانی درصدی ۷۲/۵٪ زیر ۶ ساعت، ۱۴۶ نفر با فراوانی درصدی ۲۴/۲٪ بین ۶ تا ۲۴ ساعت و ۲۰ نفر با فراوانی درصدی ۳/۳٪ بیش از ۲۴ ساعت بود.

نتیجه گیری: شیوع بالای علل مرگ غیر تروماتیک و سابقه مثبت بیماری های مزمن قلبی و سن بالای بیماران فوت شده نشانگر اهمیت کنترل و پیشگیری از این بیماری ها را در این منطقه نشان می دهد. با توجه به آمار بالای مرگ افراد مراجعه کننده بدون شرایط اعزام، این مطالعه نشان دهنده ی اهمیت کمک های اولیه و اعزام با آمبولانس بود.

کلمات کلیدی: مرگ، مرگ بیمارستانی، تروما، بیماری مزمن