

ارتباط بین اختلال نقص توجه - بیش فعالی و آسیب های ناشی از تروما: مطالعه مرور سیستماتیک و متآنالیز

چکیده

مقدمه: این مطالعه جهت ارزیابی ارتباط اختلال نقص توجه_بیش فعالی و تروما در میان بزرگسالان و نیز جهت اندازه گیری مقدار این اثر با استفاده از مرور سیستماتیک و متآنالیز میباشد.

روش کار: این مطالعه مرور سیستماتیک ارتباط اختلال نقص توجه_بیش فعالی و تروما را در میان بزرگسالان و نوجوانان ۱۵ ساله و بیشتر بررسی میکند. برای گزارش اندازه اثر از نسبت شانس و اختلاف میانگین استاندارد استفاده شد.

نتایج: تعداد ۱۳ مقاله ای که ارتباط اختلال نقص توجه_بیش فعالی و تروما را به خوبی نشان داده بودند وارد متآنالیز شدند و نسبت شانس بدست آمده ۱.۹۸ میباشد با فاصله اطمینان

(95% CL : 1.47_2.67)

که با استفاده از مدل اثر تصادفی بدست آمد. نتایج در متآنالیز جداگانه مطالعات کوهورت اختلاف زیادی با مجموع مطالعات ندارد بطوریکه نسبت شانس در مطالعات کوهورت ۲.۱۹ گزارش شد.

بحث: بزرگسالان مبتلا به اختلال نقص توجه_بیش فعالی نزدیک به دو برابر ریسک افزایش یافته تروما دارند.

کلمات کلیدی: اختلال نقص توجه_بیش فعالی بزرگسالان . اختلالات روانپزشکی. تروما ها. اختلال نقص توجه_بیش فعالی. تصادفات. مرور سیستماتیک.